


TEENDŐK FÉLRENYELÉS ESETÉN



CSECSEMŐ ÉS GYERMEK ÚJRAÉLESZTÉS

REAKCIÓKÉPES?

SEGÍTSÉG (TEL: 112)

LÉGÚTFELSZABADÍTÁS



neutrális fejhelyzet



hátrabillentett fej

LÉGZÉSVIZSGÁLAT 10"

nincs



orba és szája



orrot befogva szája

ÉLETJELENSÉG?

nincs



15 MELLKASI NYOMÁS

2 BEFÚJÁS, 15 MELLKASI NYOMÁS



GYERMEK ELSŐSEGÉLY

Töltsd le az
INGYENES
APP-ot:



Csúszda: Csak akkor kezdjén csúszni a fenti gyermek, ha az alján már nincsen senki!

Napsapka, naptejt 11-15 óra között ne legyünk sokat a tűző napon.

Hintázás: Ne legyen más gyermek a hintázó körül!
Ne ugorjanak ki a gyermekek a hintából!

Magasból esés: (testmagasság kétszeresénél magasabbról) helyezjük a gyermeket nyugalomba, figyeljük meg, ha nem mozog, ne mozdítsuk, rögzítsük a talált helyzetben, hívjunk mentőt. Tudatzavar, fejfájás, hányás, bizonytalanság érzés, emlékeztetési agyrázkodásra utal. Eszméletlen gyermeket óvatosan fordítsuk az oldalára a mentő érkezéséig.



Végtagsérülés: Nagy fájdalom, deformitás esetén hívjunk mentőt. A gyermek magának tartsa úgy a sérült részt, ahogy legkisebb a fájdalma. Ne mozgassuk, ne kötözzük.



Orrvérzés: enyhén előredöntött fejjel ültessük a gyermeket, orrcimpáit szorítsuk össze 10 percig. Ha nem áll el, vagy erős a vérzés, hívj mentőt!



Görccsroham: A gyermeket fordítsuk óvatosan az oldalára, védjük a sérüléstől, hívjunk mentőt.

Mérgezés: Ne hánytassuk a gyermeket! A mérgező anyagot adjuk át a mentőknek.

Elsősegély tanfolyam:



Rovarcspis esetén akkor kell allergiára gondolni, ha a csípés helyén lévő bőrir mellett más tünet is jelentkezik (kiütések, légúti duzzanat, elsápadás, kipirulás, szédülés, ájulás, rekedtség, fulladás, hányinger, hasmenés), vagy nyakon, vagy szájüregben történik a csípés. Enyhe esetben antihisztamin, súlyos esetben ónadagoló toll (Anapen/Epipen Junior) segíthet a mentő érkezéséig.

MENTŐK 112